

Mallory PTAH 染色液(自然氧化法)

产品简介:

肌纤维(Muscle fiber)属于肌组织成分, 由肌细胞组成, 根据形态和功能特点, 肌纤维可以分为平滑肌(又称横纹肌)、骨骼肌、心肌。肌纤维染色的方法有很多种, 如丽春红法、苯胺蓝法、钨磷酸苏木素法等, 最初发明钨磷酸苏木素染色液时, Mallory 的 PTAH 方法中有多种钨磷酸苏木素方法, 1900 年左右 Mallory 将钨磷酸水溶液和苏木素染液联用, 发现该法对于肌纤维染色较好, 现在广泛使用的即为 Mallory 钨磷酸苏木素染色液(PTAH 自然氧化法)。苏木素可用 PTAH 化学氧化法, 但有效期较短且染色力易下降, 尽管自然氧化耗费时间, 但制得的苏木素可用 2 年以上, 染色力也不易丢失, 是较为理想的染色液, 适用于 CNS、一般组织结构以及所有标准固定液固定的组织, 染色时间依配制方法、所用固定液和所显示的组织结构而异。

Leagene Mallory PTAH 染色液(自然氧化法)又称 Mallory 钨磷酸苏木素染色液, 为自然成熟的染液, 染色力较好, 保存时间长, 多用于显示横纹肌的横纹, 临床上应用该法对横纹肌肉瘤进行诊断, 横纹肌肉瘤的组织学形态变化多样, 与未分化的间胚叶肿瘤很难鉴别; 采用钨磷酸苏木素染色后, 如果在瘤细胞胞质内发现蓝色横纹, 则可以证明该肿瘤是呈横纹肌分化; 该染色液也可以对炎症渗出的纤维素、DIC 的毛细血管中纤维素以及神经病理等方面进行染色。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DC0001	Storage
	Mallory PTAH 染色液(自然氧化法)		100ml
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、10%福尔马林固定液
- 2、酸化高锰酸钾溶液
- 3、草酸溶液
- 4、蒸馏水
- 5、系列乙醇
- 6、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织固定于 10%福尔马林固定液中，常规脱水包埋。
- 2、石蜡切片厚 4 μ m，常规二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、入酸化高锰酸钾氧化 5min，稍水洗。
- 4、入草酸溶液漂白 1~2min，自来水冲洗 2min，用蒸馏水洗 1 次。
- 5、入 Mallory PTAH 染色液(自然氧化法)浸染(加盖)24~48h。
- 6、取出切片，直接用 95%的乙醇迅速洗去多余染液。
- 7、常规脱水，二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

染色结果:

横纹肌的横纹、纤维素、胞核、 红细胞和神经胶质纤维	深蓝色
胶原纤维、软骨基质	棕红色
粗的弹性纤维	紫色

注意事项:

- 1、在染色时若显示横纹的蓝色不够或横纹呈鲜红色，说明氧化时间不足或者可能是已过度氧化，需要重新换染液或配制新液。
- 2、Mallory PTAH 染色液染色后不要水洗，在 95%乙醇洗时也要迅速，因为水洗或乙醇洗的时间稍长，都可以洗脱磷钨酸苏木素所着染的颜色。
- 3、Mallory 磷钨酸苏木素为进行性染色，不要过染，在染色 24 小时后，可取出在显微镜下观察着色程度。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DG0005	糖原 PAS 染色液
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)