

## DF 培养基

### 产品简介:

植物根际存在各种微生物, 2~5%的细菌能促进植物生长, 增加作物产量, 被称为根际促生细菌(PGPR), 植物根际促生细菌的研究对开发植物专化型微生物菌剂, 促进农作物增产增收有重要意义。

Leagene DF 培养基主要由磷酸盐、葡萄糖、葡萄糖酸、柠檬酸、等组成, 并含有众多微量元素如锰、铜、铁、锌等金属离子等, 经无菌处理, 该试剂不含 ACC 等氮源。DF 培养基常与 ADF 培养基联合使用, 用于分析细菌的 ACC 脱氨酶特性, 菌株置于 ADF 培养基中的生长要好于 DF 培养基, 说明该菌株能够以 ACC 为唯一氮源进行生长, 即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	CM0311	Storage
	DF 培养基		500ml
使用说明书		1 份	

### 自备材料:

- 1、ADF 培养基、NDF 培养基(选做)
- 2、无菌离心管或培养器皿、接种环、摇床、比色杯、分光光度计

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取无菌离心管或培养器皿, 加入 3ml DF 培养基、ADF 培养基(选做)、NDF 培养基(选做)。
- 2、将纯化的菌株同时接种于上述 DF 培养基、ADF 培养基(选做)、NDF 培养基(选做)中, 置于摇床 150r/min 振荡培养 72h。
- 3、观察同一菌株在 DF 培养基、ADF 培养基(选做)、NDF 培养基(选做)三种不同培养基中的生长情况。
- 4、用分光光度计在 600nm 处测定各培养菌液的 OD 值, 以便判断菌株长势。

### 结果:

当菌株置于 NDF 培养基中的生长要好于 DF 培养基时, 说明该菌株能够以铵离子为唯一氮源进行生长。

当菌株置于 ADF 培养基中的生长明显好于 DF 培养基时, 说明该菌株能够以 ACC 为唯

一氮源进行生长, 即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。

**注意事项:**

- 1、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、如果没有分光光度计, 也可以使用普通的酶标仪测定。
- 4、置于 DF 培养基、NDF 培养基中培养是可选步骤, 不是必须步骤。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CM0004	LB 培养基
CM0311	DF 培养基
CM0319	NDF 培养基
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)